

Escorpión negro

Alacrán negro

Nombre científico:

Caraboctonus keyserlingi Pocock, 1893
(Caraboctonidae)



E



4 - 6 cm



Descripción: Escorpiones de tamaño mediano, de entre 4 y 6 cm de largo, de color castaño rojizo muy oscuro y uniforme. Las hembras poseen una cutícula más brillante y menos opaca que los machos.

Distribución: Endémica de Chile; desde Paposo en la Región de Antofagasta hasta la Región Metropolitana, en la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt, hemos registrado a *Caraboctonus keyserlingi* sólo en Isla Choros.

Hábitat: Especie notablemente adaptable, se lo encuentra en casi todos los ambientes de la zona centro y norte de Chile, desde el nivel del mar, hasta unos 1500 metros de altura, habitando incluso en áreas peridomiciliarias -la hemos colectada en diversas localidades del Valle del Elqui-. Se encuentra ausente sólo de las áreas de dunas o en zonas extremadamente áridas.

Dieta: Depreda pequeños artrópodos, insectos, arañas y otros escorpiones; de hábitos nocturnos.

Estado de conservación: Esta es una especie muy común que por el momento no se encuentra amenazada.

Referencias:

AGUSTO P, CI MATTONI, J PIZARRO-ARAYA, J CEPEDA-PIZARRO & F LÓPEZ CORTÉS (2006) Comunidades de escorpiones (Arachnida: Scorpiones) del desierto costero transicional de Chile. Revista Chilena de Historia Natural 79 (4): 407-421.

LOURENÇO WR (1995) Considerations sur la morphologie, écologie et biogéographie de *Caraboctonus keyserlingi* Pocock (Scorpiones, Iuridae). Boletín de la Sociedad de Biología de Concepción (Chile) 66: 63-69.

PIZARRO-ARAYA J, P AGUSTO, F LÓPEZ-CORTES, AA OJANGUREN-AFFILASTRO, R BRIONES & J CEPEDA-PIZARRO (2014) Diversidad y composición estacional de la escorpiofauna (Arachnida: Scorpiones) del archipiélago Los Choros (Región de Coquimbo, Chile). Gayana 78 (1): 46-56.

